

Zika and Sex: Information for Men with Pregnant Partners Living in Areas with Zika



What we know

- ◆ Zika virus can be spread by a man with Zika to his sex partners.
- ◆ In known cases of sexual transmission, the men had Zika virus symptoms. From these cases, we know the virus can be spread when the man has symptoms, before symptoms start, and after symptoms end.
- ◆ The virus can stay in semen longer than in blood.

What we don't know

- ◆ How long Zika virus can stay in the semen of infected men or spread through sex.
- ◆ If men infected with Zika who never develop symptoms can have Zika virus in their semen or spread Zika through sex.
- ◆ If a woman can spread Zika virus to her sex partners.



What you should know about Zika and sex

Because Zika can cause certain birth defects, take steps to prevent your partner from getting Zika during her pregnancy.

If you have vaginal, anal, or oral (mouth-to-penis) sex, use a condom from start to finish, every time you have sex during your partner's pregnancy.

OR

Don't have sex with your partner during the pregnancy.



If you think you may have or had Zika, tell your doctor or healthcare provider

- ◆ About your symptoms.
- ◆ If you have taken steps to prevent mosquito bites.
- ◆ If you had sex without a condom with your pregnant partner.



www.cdc.gov/zika



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

CS253976A April 28, 2016



Respuesta de los CDC frente al zika

El zika y las relaciones sexuales: Información para los hombres con parejas sexuales embarazadas que viven en áreas con zika



Qué sabemos

- ◆ El virus del Zika puede transmitirse de un hombre que padezca la enfermedad a sus parejas sexuales.
- ◆ En los casos conocidos de transmisión sexual, los hombres tenían síntomas del zika. A partir de estos casos, sabemos que el virus puede transmitirse cuando el hombre presenta síntomas, antes de la aparición de los síntomas y después de que desaparecen.
- ◆ El virus permanece en el semen durante más tiempo que en la sangre.

Qué no sabemos

- ◆ Cuánto tiempo puede permanecer el virus del Zika en el semen de hombres infectados o cuánto tiempo puede transmitirse a través de las relaciones sexuales.
- ◆ Si los hombres que padecieron el zika y nunca presentaron síntomas pueden transmitir el zika a través de las relaciones sexuales, o si su semen puede contener el virus.
- ◆ Si una mujer puede transmitir el virus del Zika a sus parejas sexuales.



Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales

Debido a la relación que existe entre el zika y las malformaciones congénitas, tome medidas para evitar que su pareja se infecte con el zika durante su embarazo.

Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca a pene), use condón de principio a fin, durante el embarazo de su pareja.



No mantenga relaciones sexuales con su pareja durante el embarazo.



Si piensa que puede tener o ha tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica

- ◆ Sobre sus síntomas.
- ◆ Si ha tomado medidas para evitar las picaduras de mosquitos.
- ◆ Si tuvo relaciones sexuales sin condón con su pareja embarazada.



www.cdc.gov/zika



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

CS253976A

April 28, 2016



Zika and Sex: Information for Pregnant Women Living in Areas with Zika



What we know

- ◆ Zika virus can be spread by a man with Zika to his sex partners.
- ◆ In known cases of sexual transmission, the men had Zika symptoms. From these cases, we know the virus can be spread when the man has symptoms, before symptoms start and after symptoms end.
- ◆ The virus stays in semen longer than in blood.



What we don't know

- ◆ How long Zika virus can stay in the semen of infected men or spread through sex.
- ◆ If men infected with Zika who never develop symptoms can have Zika virus in their semen or spread Zika through sex.
- ◆ If a woman can spread Zika virus to her sex partners.

What you should know about Zika and sex

Because Zika can cause certain birth defects, **take steps to prevent infection during your pregnancy.**

If you have vaginal, anal, or oral sex (mouth-to-penis), use a condom from start to finish, every time you have sex during the pregnancy.

OR

Don't have sex during your pregnancy.



If you think your male partner may have or had Zika, tell your doctor or healthcare provider

- ◆ If he has taken steps to prevent mosquito bites.
- ◆ If you had sex without a condom.

www.cdc.gov/zika



www.cdc.gov/zika

CS263974-A April 28, 2016



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention



Respuesta de los CDC frente al zika

El zika y las relaciones sexuales: Información para las mujeres embarazadas que viven en áreas con zika



Qué sabemos

- ◆ El virus del Zika puede transmitirse de un hombre que padezca la enfermedad a sus parejas sexuales.
- ◆ En los casos conocidos de transmisión sexual, los hombres tenían síntomas del zika. A partir de estos casos, sabemos que el virus puede transmitirse cuando el hombre presenta síntomas, antes de la aparición de los síntomas y después de que desaparecen.
- ◆ El virus permanece en el semen durante más tiempo que en la sangre.



Qué no sabemos

- ◆ Cuánto tiempo puede permanecer el virus del Zika en el semen de hombres infectados o cuánto tiempo puede transmitirse a través de las relaciones sexuales.
- ◆ Si los hombres que padecieron el zika y nunca presentaron síntomas, pueden contener el virus en el semen o transmitirlo a través de las relaciones sexuales.
- ◆ Si una mujer puede transmitir el virus del Zika a sus parejas sexuales.

Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales

Debido a la relación que existe entre el zika y las malformaciones congénitas, **tome medidas para evitar la infección durante el embarazo.**

Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca-pene), use condón de principio a fin, durante el embarazo de su pareja.



No tenga relaciones sexuales durante el embarazo.



Si piensa que su pareja masculina puede tener o ha tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica

- ◆ Si él ha tomado medidas para evitar las picaduras de mosquitos.
- ◆ Si usted tuvo relaciones sexuales sin condón.



31 de marzo del 2016

www.cdc.gov/zika



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

